

Cuidado de la herida tras una incisión y drenaje de un absceso

INSTRUCCIONES GENERALES

- Por favor, absténgase de nadar hasta que su herida esté curada.
- Es posible que se produzca un enrojecimiento y una leve hinchazón alrededor de la herida durante unos días. Esto es normal siempre que mejore cada día.
- Puede ducharse, darse un baño de asiento o aplicar una compresa caliente en la zona para favorecer el drenaje.

HERIDA

- Es normal que se produzca una cierta cantidad de drenaje claro y/o sangrado.
- Si se ha colocado un drenaje, es para mantener la zona abierta, favorecer el drenaje y ayudar a que la herida sane desde dentro hacia fuera.
- El drenaje puede atarse a sí mismo, o se mantiene en su lugar con una sutura a través del drenaje y la piel.
- Es aceptable que el punto o el drenaje se caiga antes de tiempo. Por favor, llame a la oficina de cirugía pediátrica si esto sucede.
- Volverá a la consulta una semana después del procedimiento de incisión y drenaje para que le retiren el drenaje.
- Cubra la zona afectada por el drenaje con una gasa y mantenga la zona limpia. Cambie las gasas cuando se saturen.

COMO LIMPIAR Y CAMBIAR EL VENDAJE

1. **Obtenga los suministros:** Gasa antiadherente, agua tibia y jabón suave.
2. Lávese bien las manos con agua y jabón.
3. Limpiar la herida con una gasa empapada en agua y jabón suave.
4. Seca la herida con suaves palmaditas.
5. Cubrir la herida con una gasa antiadherente y cinta de papel, si se desea.

No utilice alcohol, peróxido de hidrógeno ni jabones muy perfumados para limpiar y vendar la herida. No utilice pomadas, medicamentos o polvos en la zona de la herida a menos que se lo indique su médico.

MEDICACIÓN

- El dolor suele ser leve, pero si siente dolor, tome Tylenol (acetaminofén) o Motrin (ibuprofeno) según sea necesario.
- Por favor, asegúrese de completar el curso prescrito de antibióticos, si se le dá.
- Por favor, asegúrese de completar el tratamiento de antibióticos prescrito, si se ha administrado.

SEGUIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DEL DRENAJE

- Si su hijo tiene un drenaje, usted hará un seguimiento una semana después del procedimiento de incisión y drenaje en nuestra oficina para que se lo quiten. Por favor llame a nuestra oficina para programar su cita.
- Si a su hijo no se le colocó un drenaje, el médico determinará si es necesario un seguimiento.

Pediatrics Surgery of Houston

Stephen Kimmel, M.D., FACS, FAAP • Sara Fallon, M.D., M.S. • Haroon Patel, M.D., MHCM
7400 Fannin, Suite 700 • Houston, TX 77054
T: 713-796-1600 • F: 713-796-0397

PediatricsHouston.com



SURGERY OF HOUSTON