


Hernias en niños


¿QUÉ ES UNA HERNIA?

- Las hernias en los niños generalmente se deben a una debilidad en los músculos abdominales que ha estado presente desde el nacimiento. A veces, no se notan hasta más tarde en la infancia o la niñez.
- Normalmente, las hernias aparecerán como una masa o bulto en la ingle, el escroto o cerca del ombligo.
- Las hernias pueden notarse más cuando su hijo está de pie, haciendo esfuerzos, llorando o riendo.




¿QUÉ ES UNA HERNIA VERSUS UN HIDROCELE?

- A veces, puede ser difícil diferenciar una hernia inguinal de un hidrocele.
- Un hidrocele es una acumulación de líquido en el saco que rodea el testículo y puede o no afectar el abdomen. Las hernias involucran el abdomen.
- Mientras que las hernias generalmente requerirán cirugía, los hidroceles no siempre requieren cirugía durante el primer año de vida. Los hidroceles generalmente se resuelven solos a la edad de un año. Si no se disuelven, se recomienda la cirugía.




¿SON PELIGROSAS LAS HERNIAS?


- Las hernias no son peligrosas a menos que algo, como intestinos o tejido adiposo interno, se atasque en la hernia y no se pueda empujar hacia atrás con facilidad. Esto se conoce como una hernia encarcelada.
- Los síntomas de una hernia encarcelada pueden incluir dolor intenso, desconsuelo, náuseas, vómitos, decoloración de la piel e incapacidad para defecar o expulsar gases.
- Llame a nuestra oficina si presenta alguno de estos síntomas.



Tejido adiposo



Intestino atrapado



Intestino estrangulado

¿CÓMO SE REPARA UNA HERNIA?

- La reparación de una hernia es la cirugía general más frecuente que se realiza en bebés y niños.
- El procedimiento se realizará bajo anestesia general.
- Este procedimiento se realiza de forma abierta o laparoscópica.
- La cirugía laparoscópica se realiza con una pequeña cámara e instrumentos que van dentro del abdomen.

¿QUÉ DEBO ESPERAR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?

- Es posible que su hijo sienta dolor después de la cirugía.
- El cirujano de su hijo le recomendará medicamentos para el dolor, si es necesario. Puede tomar Tylenol (acetaminofén) o Motrin (ibuprofeno) según sea necesario para el dolor.
- Su hijo deberá abstenerse de practicar deportes durante al menos dos semanas después de la cirugía para recuperarse.

SEGUIMIENTO

- La hernia de su hijo será monitoreada con el tiempo en nuestra oficina. El tiempo de seguimiento será determinado por su cirujano y el plan de tratamiento.

Pediatrics Surgery of Houston

Stephen Kimmel, M.D., FACS, FAAP • Sara Fallon, M.D., M.S. • Haroon Patel, M.D., MHCM
7400 Fannin, Suite 700 • Houston, TX 77054
T: 713-796-1600 • F: 713-796-0397

PediatricsHouston.com