

Manejo del dolor de venta libre

Fecha: _____

Tylenol (acetaminofén) y Advil, Motrin (ibuprofeno) son analgésicos seguros y efectivos para su hijo cuando se toman en las dosis correctas. El ibuprofeno solo se puede usar en pacientes de 6 meses o más. Estos medicamentos están disponibles sin receta (sin receta). Son lo suficientemente fuertes como para aliviar el dolor después de la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Se ha demostrado que la alternancia de estos medicamentos en un horario establecido proporciona un mejor control del dolor que cualquiera de los medicamentos solos.

Dele a su hijo acetaminofén e ibuprofeno alternando los medicamentos cada 3 horas hasta que no sienta dolor. Proporcionar medicamentos las 24 horas del día ayudará a controlar el dolor de su hijo. Para el segundo día, la mayoría de los niños solo usan el medicamento para el dolor si es necesario.

Ejemplo: A las 9 a. m., dar acetaminofén. Al mediodía, dar ibuprofeno. A las 3 p. m., dar acetaminofén. A las 6 p. m., dar ibuprofeno. A las 9 p. m., dar acetaminofén. A medianoche, dar ibuprofeno.

Peso	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM
Tylenol (acetaminofén)						
Advil, Motrin (ibuprofeno)						

PESO

Su hijo pesa _____

TABLA DE DOSIS DE TYLENOL (ACETAMINOFÉN):

Consulte la tabla a continuación para conocer la dosis correcta. Puede repetir la dosis cada 4 a 6 horas según sea necesario. No le dé acetaminofén más de cinco veces al día. Si le recetaron hidrocodona/acetaminofén (Hycet o Norco), no le dé acetaminofén con ninguno de esos productos, ya que ambos contienen acetaminofén.

Peso	6 a 11 libras	12 a 17 libras	18 a 23 libras	24 a 35 libras	36 a 47 libras
Dosis de miligramos	40 mg	80 mg	120 mg	160 mg	240 mg
Líquido para bebés/ niños (160 mg/5 mL)	1.25 mL	2.5 mL	3.75 mL	5 mL	7.5 mL
Comprimidos masticables (160 mg cada uno)				1 tableta	1-1/2 tabletas

TABLA DE DOSIS DE TYLENOL (ACETAMINOFÉN): (CONTINUACIÓN)

Peso	48 a 59 libras	60 a 71 libras	72 a 95 libras	96+ libras
Dosis de miligramos	320 mg	400 mg	480 mg	640 mg
Líquido para bebés/ niños (160 mg/5 mL)	10 mL	12.5 mL	15 mL	20 mL
Comprimidos masticables (160 mg cada uno)	2 tabletas	2-1/2 tabletas	3 tabletas	4 tabletas

TABLA DE DOSIS DE ADVIL, MOTRIN (IBUPROFENO):

No le dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses. Determine la dosis correcta encontrando el peso de su hijo en la siguiente tabla. Puede repetir la dosis cada 6 a 8 horas según sea necesario.

Peso	12 a 17 libras	18 a 23 libras	24 a 35 libras	36 a 47 libras
Dosis de miligramos	50 mg	75 mg	100 mg	150 mg
Gotas infantiles (50 mg/1,25 ml)	1.25 mL	1.875 mL	2.5 mL	3.75 mL
Líquido infantil (100 mg/5 mL)	2.5 mL	3.75 mL	5 mL	7.5 mL
Tabletas masticables (100 mg cada una)			1 tableta	1-1/2 tabletas

Peso	48 a 59 libras	60 a 71 libras	72 a 95 libras	96+ libras
Dosis de miligramos	200 mg	250 mg	300 mg	400 mg
Líquido infantil (100 mg/5 mL)	10 mL	12.5 mL	15 mL	20 mL
Tabletas masticables (100 mg cada una)	2 tabletas	2-1/2 tabletas	3 tabletas	4 tabletas
Tabletas para adultos (200 mg cada una)	1 tableta		1-1/2 tabletas	2 tabletas

Pediatrics Surgery of Houston

Stephen Kimmel, M.D., FACS, FAAP • Sara Fallon, M.D., M.S. • Haroon Patel, M.D., MHCM

7400 Fannin, Suite 700 • Houston, TX 77054

T: 713-796-1600 • F: 713-796-0397

PediatricsHouston.com



SURGERY OF HOUSTON