

Cuidados posteriores a la retirada de los dígitos

INSTRUCCIONES PARA LOS CUIDADOS POSTERIORES A LA ELIMINACIÓN DE LOS DÍGITOS ADICIONALES:

- El apósito puede dejarse hasta 48 horas.
- El lugar de la incisión puede mojarse en dos días. Mantenga la zona seca durante dos días.
- Evite sumergir el lugar de la incisión bajo el agua durante dos semanas después de la cirugía.
- Los puntos o el pegamento son disolubles y se caerán en casa en varias semanas.
- Administre Tylenol (acetaminofén) cada 4 o 6 horas según sea necesario para el dolor. No le dé más de cinco veces al día. Consulte la tabla siguiente para conocer la dosis correcta.
- Después de dos semanas, si el sitio ha sanado, puede masajear la cicatriz con crema hidratante dos veces al día hasta que la cicatriz se haya desvanecido. Esto puede llevar dos meses o más.

TYLENOL (ACETAMINOFEN) TABLA DE DOSIS:

Peso	6 a 11 libras	12 a 17 libras	18 a 23 libras	24 a 35 libras	36 a 47 libras
Dosis en miligramos	6 a 11 libras	12 a 17 libras	18 a 23 libras	24 a 35 libras	36 a 47 libras
Líquido para bebés/niños (160 mg/5 mL)	1.25 mL	2.5 mL	3.75 mL	5 mL	7.5 mL
Tabletas Masticables (160 mg cada una)				1 tableta	1½ tableta

RAZONES PARA LLAMAR AL MÉDICO:

- Dolor no controlado con Tylenol (acetaminofén).
- Sangrado excesivo que no puede controlarse manteniendo una presión suave y continua durante cinco minutos.
- Empeoramiento del enrojecimiento o la hinchazón del lugar de la incisión.
- Drenaje turbio y maloliente del lugar de la incisión.

¿TENGO QUE HACER UN SEGUIMIENTO?

El seguimiento no suele ser necesario después de una extirpación de un dígito extra; sin embargo, si tiene alguna duda o pregunta, el personal de nuestra oficina estará encantado de ayudarle.

Pediatrics Surgery of Houston

Stephen Kimmel, M.D., FACS, FAAP • Sara Fallon, M.D., M.S. • Haroon Patel, M.D., MHCM
7400 Fannin, Suite 700 • Houston, TX 77054
T: 713-796-1600 • F: 713-796-0397

PediatricsHouston.com