

Cuidado posterior de la frenotomía

¿QUÉ ES UNA FRENOTOMÍA?

- Una frenotomía es cuando se corta el frenillo. El frenillo es una banda vertical de tejido que normalmente se encuentra debajo de la lengua y debajo del labio superior.
- Todos los niños tienen frenillo; sin embargo, algunos son más cortos y ajustados que otros, por lo que a veces se recomienda una frenotomía para ayudar con la lactancia y la alimentación.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO POSTERIOR A LA FRENOTOMÍA:

- Su bebé puede estar irritable después del procedimiento. Si es así, puede darle Tylenol (acetaminofén) por vía oral según sea necesario.
- La lactancia o la alimentación con biberón se pueden realizar inmediatamente después de la frenotomía. Ayudará a calmar a su hijo.
- Puede ocurrir un sangrado mínimo. Si es así, sostenga un pequeño trozo de gasa en el área durante aproximadamente 1 minuto para ayudar a detener el sangrado.

RAZONES PARA LLAMAR AL MÉDICO:

- Sangrado excesivo que no se puede controlar manteniendo una presión suave continua durante 5 minutos.
- Negativa a amamantar o tomar biberón.

¿NECESITO HACER UN SEGUIMIENTO?

- El seguimiento generalmente no es necesario después de una frenotomía; sin embargo, si tiene alguna inquietud o pregunta, el personal de nuestra oficina estará encantado de ayudarle.

Pediatric Surgery of Houston

Stephen Kimmel, M.D., FACS, FAAP • Sara Fallon, M.D., M.S. • Haroon Patel, M.D., MHCM

7400 Fannin, Suite 700 • Houston, TX 77054

T: 713-796-1600 • F: 713-796-0397

PediatricHouston.com