

Torsión testicular

¿QUÉ ES LA TORSIÓN TESTICULAR?


- La torsión testicular es cuando el testículo se retuerce anormalmente dentro del escroto, cortando el flujo de sangre apropiado al testículo.
- El lado afectado puede estar hinchado, enrojecido o descolorido, caliente y muy sensible. También puede haber náuseas o vómitos asociados.
- Esta condición puede ocurrir después de una lesión en el escroto o testículo, o puede ocurrir espontáneamente sin ninguna causa conocida.

¿ES PELIGROSA LA TORSIÓN TESTICULAR?


- La torsión testicular es una emergencia médica, y la evaluación médica urgente es esencial para salvar el testículo.
- Cuanto más tiempo pase un testículo sin flujo de sangre, mayor será la probabilidad de muerte testicular.
- Si su hijo tiene algún síntoma de torsión testicular, como se mencionó anteriormente, busque atención médica en el departamento de emergencias más cercano de inmediato.

¿CÓMO SE TRATA LA TORSIÓN TESTICULAR?

- En la sala de emergencias, el médico puede realizar la detorsión manual o “destorsión” del testículo como medida temporal antes de la cirugía.
- La reparación quirúrgica implica destorcer el testículo y anclar el testículo en su lugar apropiado con suturas. Este procedimiento se llama orquidopexia.
- Si el testículo ha pasado demasiado tiempo sin flujo de sangre y no hay posibilidad de salvarlo, se extirpará quirúrgicamente. Este procedimiento se llama orquiectomía.
- En el caso de torsión testicular, siempre se evaluará el testículo no afectado y se anclará en su lugar apropiado con suturas en cirugía para evitar que se vuelva a torcer en el futuro.
- Incluso si se ha sometido a una cirugía por torsión testicular en el pasado, siempre busque atención médica si reaparecen síntomas similares.




Torsión testicular: Síntomas comunes



¿QUÉ DEBE ESPERAR MI HIJO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?

- Su hijo sentirá dolor después de la cirugía y el escroto se verá hinchado y magullado hasta por un par de semanas después del procedimiento.
- Se recomienda ropa interior ajustada después de la cirugía.
- Los deportes, la actividad física excesiva y las actividades a horcajadas (bicicleta, equitación, etc.) deberán evitarse después de la cirugía durante un par de semanas. El regreso al juego quedará a discreción de su cirujano.
- Su cirujano le recomendará medicamentos para el dolor si es necesario.



CITA DE SEGUIMIENTO

- Programe una cita de seguimiento en nuestra oficina para pacientes ambulatorios.
- Cita de seguimiento programada para _____.
- Comuníquese con nuestra oficina si tiene preguntas o inquietudes adicionales.

Pediatric Surgery of Houston

Stephen Kimmel, M.D., FACS, FAAP • Sara Fallon, M.D., M.S. • Haroon Patel, M.D., MHCM

7400 Fannin, Suite 700 • Houston, TX 77054

T: 713-796-1600 • F: 713-796-0397

PediatricHouston.com